

Тензорные произведения

AC13◦1. Покажите, что $K \otimes_K M \simeq M$ для всех модулей M над любым коммутативным кольцом K .

AC13◦2. Пусть $f_m : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $z \mapsto mz$, и $g_k : \mathbb{Z}/(n) \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$, $[z] \mapsto [kz]$. Канонический изоморфизм $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) \simeq \mathbb{Z}/(n)$, $x \otimes [y]_n \mapsto [xy]_n$, превращает каждый гомоморфизм \mathbb{Z} -модулей

$$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) \rightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n)$$

в гомоморфизм $\mathbb{Z}/(n) \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$. В какие гомоморфизмы $\mathbb{Z}/(n) \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$ превратятся $f_m \otimes_{\mathbb{Z}} g_k$ при разных $m, k \in \mathbb{N}$? Опишите их ядра и образы, а также ядра и образы самих f_m и g_k . Не забудьте рассмотреть случаи $m = 1$ и $k = 1$.

AC13◦3. Для любых модулей над произвольным коммутативным кольцом K постройте канонические изоморфизмы

- а) $(M \oplus N) \otimes L \simeq (M \otimes L) \oplus (N \otimes L)$ б) $\text{Hom}(M \oplus N, L) \simeq \text{Hom}(M, L) \oplus \text{Hom}(N, L)$
- в) $\text{Hom}(L, M \oplus N) \simeq \text{Hom}(L, M) \oplus \text{Hom}(L, N)$ г) $\text{Hom}(L \otimes M, N) \simeq \text{Hom}(L, \text{Hom}(M, N))$.

AC13◦4. Вычислите $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/(18), \mathbb{Z}/(12))$ и $\mathbb{Z}/(12) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(18)$.

AC13◦5. Докажите, что а) $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}$ б) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0$ в) $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0$
 г) $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) = 0$ д) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) = 0$ е) $\mathbb{Z}/(m) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(n) \simeq \mathbb{Z}/(\text{НОД}(m, n))$
 ж) $(K/I) \otimes_K (K/J) \simeq K/(I+J)$ для всех идеалов I, J любого коммутативного кольца K .

Всюду далее речь идёт про конечномерные векторные пространства над произвольным полем \mathbb{k} .

AC13◦6. Докажите, что среди векторов v_1, \dots, v_n , лежащих соответственно в пространствах V_1, \dots, V_n , тогда и только тогда есть нулевой вектор, когда все полилинейные отображения $V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ во все пространства W зануляются на наборе аргументов (v_1, \dots, v_n) .

AC13◦7. Пользуясь каноническим изоморфизмом $W \otimes U^* \simeq \text{Hom}(U, W)$, запишем операторы $g : U \rightarrow V$ и $f : V \rightarrow W$ в виде $g = \sum_i v_i \otimes \varphi_i$, $f = \sum_j w_j \otimes \psi_j$ с $v_i \in V$, $\varphi_i \in U^*$, $w_j \in W$, $\psi_j \in V^*$. Запишите их композицию $fg \in \text{Hom}(U, W) \simeq W \otimes U^*$ в виде а) $\sum_j w_j \otimes \xi_j$ б) $\sum_i u_i \otimes \varphi_i$, явно вычислив $\xi_j \in U^*$ и $u_i \in W$.

AC13◦8. Рассмотрим двойственные друг другу базисы e_1, \dots, e_n и x_1, \dots, x_n в V и в V^* . В какой оператор $V \rightarrow V$ переходит при изоморфизме из зад. AC13◦7 тензор Казимира $\sum x_i \otimes e_i$?

AC13◦9. Покажите, что линейное отображение $\tau : \text{End}(V) \simeq V \otimes V^* \rightarrow (V \otimes V^*)^* \simeq \text{End}(V)^*$, переводящее $v \otimes \xi$ в линейную форму $u \otimes \varphi \mapsto \xi(u) \cdot \varphi(v)$, корректно определено и задаёт на векторном пространстве $\text{End}(V)$ корреляцию¹. Какая билинейная форма на $\text{End}(V)$ ей отвечает²? Вырождена ли она? Симметрична ли? Какую квадратичную форму задаёт?

AC13◦10. Опишите цикловый тип тензорного квадрата $f^{\otimes 2} : V^{\otimes 2} \rightarrow V^{\otimes 2}$ нильпотентного оператора $f : V \rightarrow V$ циклового типа а) б) в) г) .

AC13◦11. Пусть операторы $f : U \rightarrow U$ и $g : W \rightarrow W$ диагонализуемы с собственными числами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ и μ_1, \dots, μ_m . Перечислите собственные числа оператора $f \otimes g$.

AC13◦12. Докажите для линейных отображений $f_1 : U_1 \rightarrow W_1$ и $f_2 : U_2 \rightarrow W_2$ равенства
 а) $\text{im } f_1 \otimes f_2 = \text{im } f_1 \otimes \text{im } f_2$ б) $\ker f_1 \otimes f_2 = \ker f_1 \otimes U_2 + U_1 \otimes \ker f_2$.

¹Напомню, что корреляцией (или, на физической фене, спуском индексов) называется линейное отображение $\beta : V \rightarrow V^*$. Пространство корреляций изоморфно пространству билинейных форм $b : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$. Изоморфизм переводит корреляцию β в форму $b(u, w) = \langle u, \beta(w) \rangle$ (свёртка вектора $u \in V$ и ковектора $\beta(w) \in V^*$). Билинейная форма b называется вырожденной, если существует такой вектор $u \neq 0$, что $b(u, v) = 0$ для всех v , и называется симметричной, если $b(u, w) = b(w, u)$ для всех u, w . Каждая билинейная форма $b : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$ задаёт квадратичную форму $q_b : V \rightarrow \mathbb{k}$, $q_b(v) = b(v, v)$.

²Явно вычислите эту форму в терминах матриц операторов.