

§2. Аффинные преобразования

2.1. Аффинные отображения. Отображение $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ между аффинными пространствами, ассоциированными с векторными пространствами U, W , называется *аффинным*, если найдётся такая точка $o \in \mathbb{A}(U)$, что отображение между векторными пространствами

$$D_\varphi : U \rightarrow W, \quad \overline{op} \mapsto \overline{\varphi(o)\varphi(p)} \quad (2-1)$$

линейно, т. е. $D_\varphi(\alpha\overline{oa} + \beta\overline{ob}) = \alpha D_\varphi(\overline{oa}) + \beta D_\varphi(\overline{ob})$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ и $a, b \in \mathbb{A}(U)$.

ЛЕММА 2.1

Если отображение $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ аффинно, то отображение (2-1) линейно для каждой точки $o \in \mathbb{A}(U)$ и не зависит от выбора этой точки.

Доказательство. Если построенное по некоторой точке $o \in \mathbb{A}(U)$ отображение D_φ из формулы (2-1) линейно, то для любой точки $p \in \mathbb{A}(U)$ и любого вектора $\overline{pq} = \overline{oq} - \overline{op} \in U$ выполняется равенство

$$D_\varphi(\overline{pq}) = D_\varphi(\overline{oq}) - D_\varphi(\overline{op}) = \overline{\varphi(o)\varphi(q)} - \overline{\varphi(o)\varphi(p)} = \overline{\varphi(p)\varphi(q)}.$$

Тем самым, $D_\varphi(\overline{pq}) = \overline{\varphi(p)\varphi(q)}$ для всех $p, q \in \mathbb{A}(U)$, т. е. при замене точки o на точку p мы получим то же самое отображение $D_\varphi : U \rightarrow W$, что и в точке o . \square

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1

Отображение $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ аффинно тогда и только тогда, когда оно переводит барицентрические комбинации точек в барицентрические комбинации их образов с теми же весами, т. е. $\varphi(\mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 + \dots + \mu_m p_m) = \mu_1 \cdot \varphi(p_1) + \mu_2 \cdot \varphi(p_2) + \dots + \mu_m \cdot \varphi(p_m)$ для любых $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathbb{A}(U)$ и любых $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ с $\sum \mu_i = 1$.

Доказательство. Если отображение $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ аффинно, то при любом выборе начальной точки o и любых весах $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ с $\sum \mu_i = 1$

$$\begin{aligned} \varphi(\mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 + \dots + \mu_m p_m) &= \varphi(o + \mu_1 \overline{op}_1 + \mu_2 \overline{op}_2 + \dots + \mu_m \overline{op}_m) = \\ &= \varphi(o) + D_\varphi(\mu_1 \overline{op}_1 + \mu_2 \overline{op}_2 + \dots + \mu_m \overline{op}_m) = \\ &= \varphi(o) + \mu_1 \cdot D_\varphi(\overline{op}_1) + \mu_2 \cdot D_\varphi(\overline{op}_2) + \dots + \mu_m \cdot D_\varphi(\overline{op}_m) = \\ &= \mu_1 \cdot (\varphi(o) + D_\varphi(\overline{op}_1)) + \dots + \mu_m \cdot (\varphi(o) + D_\varphi(\overline{op}_m)) = \\ &= \mu_1 \cdot \varphi(p_1) + \mu_2 \cdot \varphi(p_2) + \dots + \mu_m \cdot \varphi(p_m). \end{aligned}$$

Наоборот, пусть отображение $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ сохраняет барицентрические комбинации. Тогда при любом выборе начальной точки o для всех точек $p, q \in \mathbb{A}(U)$ и чисел $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ точка

$$r = o + \lambda \cdot \overline{op} + \mu \cdot \overline{oq} = (1 - \lambda - \mu)o + \lambda p + \mu q$$

перейдёт в точку $\varphi(r) = (1 - \lambda - \mu)\varphi(o) + \lambda\varphi(p) + \mu\varphi(q) = \varphi(o) + \lambda \overline{\varphi(o)\varphi(p)} + \mu \overline{\varphi(o)\varphi(q)}$. Зафиксируем точку o и определим отображение $D_\varphi : U \rightarrow W$ правилом $D_\varphi(\overline{or}) = \overline{\varphi(o)\varphi(r)}$. Тогда для любой точки r получаем $\varphi(r) = \varphi(o) + D_\varphi(\overline{or})$, а для всех векторов $\overline{op}, \overline{oq} \in U$ и чисел $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ имеем равенство

$$D_\varphi(\lambda \overline{op} + \mu \overline{oq}) = D_\varphi(\overline{or}) = \overline{\varphi(o)\varphi(r)} = \lambda \overline{\varphi(o)\varphi(p)} + \mu \overline{\varphi(o)\varphi(q)} = \lambda D_\varphi(\overline{op}) + \mu D_\varphi(\overline{oq}),$$

означающее, что отображение $D_\varphi : U \rightarrow W$ линейно. \square

2.1.1. Дифференциал аффинного отображения. Линейное отображение

$$D_\varphi : U \rightarrow W, \quad \overline{p\bar{q}} \mapsto \overline{\varphi(p)\varphi(q)}$$

называется *дифференциалом* аффинного отображения $\varphi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$.

Если аффинные отображения $\varphi, \psi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ имеют одинаковый дифференциал, то для всех $p, q \in \mathbb{A}(U)$ выполняется равенство $\overline{\varphi(p)\varphi(q)} = \overline{D_\varphi(\overline{p\bar{q}})} = \overline{D_\psi(\overline{p\bar{q}})} = \overline{\psi(p)\psi(q)}$. По упр. 1.6 на стр. 14 оно равносильно равенству $\overline{\varphi(p)\psi(q)} = \overline{\varphi(q)\psi(p)}$, т. е. вектор $w = \overline{\varphi(p)\psi(q)}$ не зависит от выбора точки $p \in \mathbb{A}(U)$. Это означает, что $\psi = \tau_w \circ \varphi$ является композицией отображения φ с последующим сдвигом $\tau_w : \mathbb{A}(W) \rightarrow \mathbb{A}(W), p \mapsto p + w$, на вектор w .

Предложение 2.2

Если отображения $\varphi : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(W)$ и $\psi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(V)$ аффинны, то их композиция

$$\varphi \circ \psi : \mathbb{A}(U) \rightarrow \mathbb{A}(W), \quad x \mapsto \varphi(\psi(x)),$$

тоже аффинна и имеет дифференциал $D_{\varphi \circ \psi} = D_\varphi \circ D_\psi$.

Доказательство. Отображение $D_{\varphi \circ \psi} : U \rightarrow W$, переводящее вектор $\overline{p\bar{q}} \in U$ в вектор

$$\overline{\varphi(\psi(p))\varphi(\psi(q))} = \overline{D_\varphi(\overline{\psi(p)\psi(q)})} = \overline{D_\varphi(D_\psi(\overline{p\bar{q}}))} \in W,$$

является композицией $D_\varphi \circ D_\psi$ линейных отображений D_φ и D_ψ . Поэтому оно тоже линейно: для любых $a, b \in U$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{k}$ имеем равенства $D_\varphi(D_\psi(\alpha a + \beta b)) = D_\varphi((\alpha D_\psi(a) + \beta D_\psi(b))) = \alpha D_\varphi(D_\psi(a)) + \beta D_\varphi(D_\psi(b))$. \square

2.1.2. Запись линейных отображений в координатах. Если в двумерном векторном пространстве V зафиксирован базис e_1, e_2 , всякое линейное отображение $\varphi : V \rightarrow V$ однозначно задаётся указанием образов базисных векторов $f_1 = \varphi(e_1)$ и $f_2 = \varphi(e_2)$. Произвольный вектор $v = e_1 x_1 + e_2 x_2$ переходит при этом в вектор

$$\varphi(v) = \varphi(e_1 \cdot x_1 + e_2 \cdot x_2) = \varphi(e_1) \cdot x_1 + \varphi(e_2) \cdot x_2 = f_1 \cdot x_1 + f_2 \cdot x_2. \quad (2-2)$$

Упражнение 2.1. Убедитесь, что при любом выборе векторов $f_1, f_2 \in V$ формула (2-2) задаёт линейное отображение $\varphi : V \rightarrow V$.

Если векторы f_1 и f_2 имеют в базисе (e_1, e_2) координаты $\begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$, т. е.

$$f_1 = e_1 \cdot \varphi_{11} + e_2 \cdot \varphi_{21} \quad \text{и} \quad f_2 = e_1 \cdot \varphi_{12} + e_2 \cdot \varphi_{22}, \quad (2-3)$$

то по формуле (2-2) действие отображения φ на произвольный вектор v с координатами $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ задаётся правилом

$$\varphi : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix} \cdot x_2 = \begin{pmatrix} \varphi_{11}x_1 + \varphi_{12}x_2 \\ \varphi_{21}x_1 + \varphi_{22}x_2 \end{pmatrix}, \quad (2-4)$$

которое принято сокращённо записывать как $x \mapsto \Phi_e x$, где

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \Phi_e = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \Phi_e x = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \varphi_{11}x_1 + \varphi_{12}x_2 \\ \varphi_{21}x_1 + \varphi_{22}x_2 \end{pmatrix}.$$

При этом используются следующие соглашения: под произведением ab строки a на столбец b , высота которого равна ширине строки, понимается сумма произведений

$$(a_1, a_2, \dots, a_s) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_s b_s, \quad (2-5)$$

а под произведением $P = AB$ таблицы A из m строк ширины s на таблицу B из n столбцов той же самой высоты s понимается таблица из m строк и n столбцов, у которой в пересечении i -той строки и j -того столбца стоит произведение i -той строки таблицы A на j -тый столбец таблицы B , вычисленное по формуле (2-5):

$$p_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{v=1}^s a_{iv} b_{vj}. \quad (2-6)$$

Таблицы из m строк и n столбцов принято называть *матрицами* размера $m \times n$. Матрица

$$\Phi_e = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей линейного отображения* φ в базисе $\mathbf{e} = (e_1, e_2)$, а её определитель

$$\det \Phi_e = \det(f_1, f_2) = \varphi_{11}\varphi_{22} - \varphi_{12}\varphi_{21}$$

называется *определителем отображения* φ и обозначается $\det \varphi$. Если положить

$$\mathbf{e} = (e_1, e_2), \quad \varphi(\mathbf{e}) = (f_1, f_2),$$

где в правых частях стоят 1×2 матрицы из векторов, то две формулы (2-3) свернутся в одно матричное равенство $\varphi(\mathbf{e}) = \mathbf{e} \Phi_e$. Разложение $v = e_1 x_1 + e_2 x_2$ вектора v по базису \mathbf{e} в матричных обозначениях записывается равенством $v = \mathbf{e} \mathbf{x}$, в котором $\mathbf{e} = (e_1, e_2)$ — строчка из векторов, а $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ — столбец из чисел. Линейность отображения $\varphi : V \rightarrow V$ означает, что

$$\varphi(v) = \varphi(\mathbf{e} \mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{e}) \mathbf{x}.$$

Эти равенства являются матричной записью вычисления (2-2). Подставляя $\varphi(\mathbf{e}) = \mathbf{e} \Phi_e$ в правую часть, мы заключаем, что $\varphi(v) = \mathbf{e} \Phi_e \mathbf{x}$, т. е. столбец координат вектора $\varphi(v)$ в базисе \mathbf{e} равен произведению $\Phi_e \mathbf{x}$ матрицы Φ_e на столбец \mathbf{x} .

Следующие далее утверждения мы будем доказывать в предположении, что $\dim V = 2$. В полной общности мы вернёмся к ним чуть позже.

Предложение 2.3

Композиция $\psi \circ \varphi$ линейных отображений $\psi, \varphi : V \rightarrow V$ с матрицами Ψ_e и Φ_e линейна и имеет матрицу $\Psi_e \Phi_e$. В частности, умножение 2×2 матриц ассоциативно, т. е. $(AB)C = A(BC)$.

Доказательство. Линейность композиции проверяется непосредственно:

$$\begin{aligned}\psi\varphi(\lambda u + \mu w) &= \psi(\varphi(\lambda u + \mu w)) = \psi(\lambda\varphi(u) + \mu\varphi(w)) = \\ &= \lambda\psi(\varphi(u)) + \mu\psi(\varphi(w)) = \lambda\psi\varphi(u) + \mu\psi\varphi(w).\end{aligned}$$

Вычисление: $\psi(\varphi(\mathbf{e})) = \psi(\mathbf{e} \cdot \Phi_{\mathbf{e}}) = \psi(\mathbf{e}) \cdot \Phi_{\mathbf{e}} = \mathbf{e} \cdot \Psi_{\mathbf{e}} \cdot \Phi_{\mathbf{e}}$ показывает, что композиция $\psi\varphi$ имеет в базисе \mathbf{e} матрицу $\Psi_{\mathbf{e}}\Phi_{\mathbf{e}}$. Поскольку композиция отображений очевидным образом ассоциативна¹, ассоциативно и умножение матриц. \square

Предложение 2.4

Для любой формы площади $s : V \times V \rightarrow \mathbb{k}$ и любых векторов $v_1, v_2 \in V$

$$s(\varphi(v_1), \varphi(v_2)) = s(v_1, v_2) \cdot \det \Phi_{\mathbf{e}}. \quad (2-7)$$

В частности, определитель $\det \varphi = \det \Phi_{\mathbf{e}} = s(\varphi(v_1), \varphi(v_2)) / s(v_1, v_2)$ зависит от φ и не зависит от базиса \mathbf{e} . Линейное отображение $\varphi : V \rightarrow V$ биективно если и только если $\det \varphi \neq 0$.

Доказательство. Образум из векторов v_1 и v_2 матрицу $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ размера 1×2 . Тогда $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{e\mathbf{v}}$, где $C_{e\mathbf{v}}$ — числовая матрица размера 2×2 , столбцы которой являются столбцами координат векторов v_1, v_2 в базисе $\mathbf{e} = (e_1, e_2)$. Поскольку отображение φ линейно $(\varphi(v_1), \varphi(v_2)) = \varphi(\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{e} C_{e\mathbf{v}}) = \varphi(\mathbf{e}) C_{e\mathbf{v}} = (f_1, f_2) C_{e\mathbf{v}}$, где $(f_1, f_2) = (\varphi(e_1), \varphi(e_2)) = (e_1, e_2) \Phi_{\mathbf{e}}$. По сл. 1.2 на стр. 13 для любой ненулевой формы площади s на V выполняются равенства

$$s(\varphi(v_1), \varphi(v_2)) = s(f_1, f_2) \det C_{e\mathbf{v}} = s(e_1, e_2) \det \Phi_{\mathbf{e}} \det C_{e\mathbf{v}}.$$

Так как $s(e_1, e_2) \det C_{e\mathbf{v}} = s(v_1, v_2)$, мы получаем (2-7). Если $\det \Phi_{\mathbf{e}} = \det(f_1, f_2) \neq 0$, то пара векторов $\mathbf{f} = (f_1, f_2)$ тоже является базисом в V . Отображение φ переводит вектор $u = \mathbf{e}\mathbf{x}$ со столбцом координат \mathbf{x} в базисе \mathbf{e} в вектор $\varphi(u) = \varphi(\mathbf{e})\mathbf{x} = \mathbf{f}\mathbf{x}$ с тем же самым столбцом координат \mathbf{x} , но только в базисе \mathbf{f} . Тем самым, оно биективно. Если же $\det(f_1, f_2) = 0$, то $f_1 = \lambda f_2$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{k}$, откуда $\varphi(e_1) = \varphi(\lambda e_2)$. Поскольку $e_1 \neq \lambda e_2$, отображение φ не биективно. \square

Упражнение 2.2. Докажите для 2×2 матриц A и B равенство $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

2.1.3. Запись аффинных отображений в координатах. Зафиксируем на аффинной плоскости \mathbb{A}^2 над двумерным векторным пространством V координатный репер $(o; e_1, e_2)$. Пусть аффинное отображение $\varphi : \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^2$ переводит его начальную точку o в точку $b = \varphi(o)$ с координатами $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$, а дифференциал $D_{\varphi} : V \rightarrow V$ имеет в базисе $\mathbf{e} = (e_1, e_2)$ матрицу

$$\Phi_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда действие отображения φ на произвольную точку с координатами $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ описывается матричной формулой $\varphi : \mathbf{x} \mapsto b + \Phi_{\mathbf{e}}\mathbf{x}$, которая в развёрнутом виде выглядит так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 + \varphi_{11}x_1 + \varphi_{12}x_2 \\ \beta_2 + \varphi_{21}x_1 + \varphi_{22}x_2 \end{pmatrix}.$$

¹Для любых трёх отображений $\alpha : A \rightarrow B$, $\beta : B \rightarrow C$, $\gamma : C \rightarrow D$ обе композиции $(\gamma\beta)\alpha$ и $\gamma(\beta\alpha)$ действуют на каждую точку $a \in A$ по одному и тому же правилу $a \mapsto \gamma(\beta(\alpha(a)))$.

УПРАЖНЕНИЕ 2.3. Убедитесь в этом, и выясните, как аффинное преобразование $x \mapsto b + Ax$ изменяет площади ориентированных параллелограммов.

Мы заключаем, что аффинное отображение плоскости однозначно задаётся своим действием на произвольно выбранный аффинный репер: для любого аффинного репера $(p; e_1, e_2)$, любой точки q и любых векторов f_1, f_2 существует единственное такое аффинное отображение φ , что $\varphi(p) = q, D_\varphi(e_1) = f_1, D_\varphi(e_2) = f_2$.

2.2. Аффинная группа. Биективные аффинные отображения $\mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V)$ называются *аффинными автоморфизмами* или *аффинными преобразованиями*. Они образуют группу преобразований¹, которая обозначается $\text{Aff}(V)$ и называется *аффинной группой* векторного пространства V . Аффинная группа координатного пространства \mathbb{k}^n обозначается $\text{Aff}_n(\mathbb{k})$. Две фигуры в аффинном пространстве называются *аффинно конгруэнтными*, если существует аффинный автоморфизм, переводящий одну из этих фигур в другую.

Следствие 2.1

Для любых треугольников $\Delta p_0 p_1 p_2, \Delta q_0 q_1 q_2$ на аффинной плоскости существует единственное аффинное преобразование этой плоскости, переводящее p_i в q_i при всех $i = 0, 1, 2$.

Доказательство. Как мы видели выше, имеется единственное такое аффинное отображение

$$\varphi : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V),$$

что $\varphi(p_0) = q_0$ и $D_\varphi(\overrightarrow{p_0 p_1}) = \overrightarrow{q_0 q_1}, D_\varphi(\overrightarrow{p_0 p_2}) = \overrightarrow{q_0 q_2}$. Произвольная точка $y \in \mathbb{A}(V)$ с радиус вектором $\overrightarrow{q_0 y} = \lambda \overrightarrow{q_0 q_1} + \mu \overrightarrow{q_0 q_2}$ является при этом образом единственной точки $x \in \mathbb{A}(V)$ с радиус вектором $\overrightarrow{p_0 x} = \lambda \overrightarrow{p_0 p_1} + \mu \overrightarrow{p_0 p_2}$. \square

Следствие 2.2

Аффинные преобразования плоскости переводят прямые в прямые, сохраняя параллельность. Любые три различные попарно не параллельные и не пересекающиеся в одной точке прямые ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 переводятся в любые три различные попарно не параллельные и не пересекающиеся в одной точке прямые $\ell'_0, \ell'_1, \ell'_2$ единственным аффинным преобразованием. \square

Предложение 2.5

Если три различные прямые ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 пересекаются в точке o , а три различные прямые $\ell'_0, \ell'_1, \ell'_2$ пересекаются в точке o' , то существует аффинное преобразование, переводящее ℓ_i в ℓ'_i при всех $i = 0, 1, 2$. Такое преобразование единственно с точностью до композиции с гомотетиями относительно точек o и o' .

Доказательство. Зафиксируем на всех прямых ℓ_i и ℓ'_i направляющие векторы v_i и v'_i . Тогда

$$v_0 = x_1 v_1 + x_2 v_2, \quad v'_0 = x_1 v'_1 + x_2 v'_2, \quad (2-8)$$

где все четыре числа $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{k}$ отличны от нуля. Аффинное преобразование φ переводит прямые ℓ_1, ℓ_2 , соответственно, в прямые ℓ'_1, ℓ'_2 если и только если $\varphi(o) = o'$ и $D_\varphi(v_1) = \lambda_1 v'_1, D_\varphi(v_2) = \lambda_2 v'_2$ для некоторых $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{k}$. Такое преобразование переводит прямую ℓ_0 в ℓ'_0 если и только если $D_\varphi(v_0) = \mu v'_0$ для некоторого $\mu \in \mathbb{k}$. Подставляя в это равенство разложения (2-8)

¹См. обсуждение на стр. 5

и пользуясь линейностью D_φ , заключаем что $\lambda_1 x_1 = \mu x'_1$ и $\lambda_2 x_2 = \mu x'_2$, откуда числа $\lambda_1 = \mu x_1/x'_1$ и $\lambda_2 = \mu x_2/x'_2$ определяются однозначно с точностью до умножения на константу μ . Поскольку преобразование φ однозначно задаётся этими числами, оно существует и единственно с точностью до гомотетии с центром в точке o или o' . \square

УПРАЖНЕНИЕ 2.4. Пусть три различные прямые ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 пересекаются в точке o . Покажите, что существует такая тройка точек $p_1 \in \ell_1, p_2 \in \ell_2, p_3 \in \ell_3$, что $\overline{op_3} = \overline{op_1} + \overline{op_2}$, и любые две такие тройки получаются друг из друга гомотетией с центром в o . Получите отсюда другое доказательство [предл. 2.5](#)

2.2.1. Двойное отношение четырёх конкурентных прямых. Две четвёрки конкурентных¹ прямых на аффинной плоскости не всегда аффинно конгруэнтны. Полным инвариантом, характеризующим четыре пересекающиеся в точке o прямые $\ell_1 = (op_1), \ell_2 = (op_2), \ell_3 = (op_3), \ell_4 = (op_4)$ с точностью до аффинного преобразования является *двойное отношение*²

$$[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] \stackrel{\text{def}}{=} \frac{s(op_1 p_3)}{s(op_2 p_3)} : \frac{s(op_1 p_4)}{s(op_2 p_4)} = \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_3})}{s(\overline{op_2}, \overline{op_3})} : \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_4})}{s(\overline{op_2}, \overline{op_4})}. \quad (2-9)$$

УПРАЖНЕНИЕ 2.5. Убедитесь, что двойное отношение не зависит ни от выбора ненулевой функции площади s , ни от выбора отличных от o точек $p_i \in \ell_i$, а также не меняется, если как-либо разбить четвёрку на две пары и одновременно переставить между собою прямые в каждой из пар: $[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] = [\ell_2, \ell_1, \ell_4, \ell_3] = [\ell_3, \ell_4, \ell_1, \ell_2] = [\ell_4, \ell_3, \ell_2, \ell_1]$.

Расположим точки p_1, p_2, p_3 так, чтобы четырёхугольник $op_1 p_3 p_2$ был параллелограммом, как в [упр. 2.4](#), а в качестве p_4 возьмём точку пересечения прямой ℓ_4 с прямой $(p_1 p_3)$, см. [рис. 2◊1](#). Тогда $p_4 = p_2 + t \cdot \overline{p_2 p_3}$, где число $t = \overline{p_2 p_4} / \overline{p_2 p_3}$ является аффинной координатой точки p_4 на прямой $(p_2 p_3)$ относительно репера с началом p_2 и базисным вектором $e = \overline{p_2 p_3}$. Положение четвёртой прямой однозначно характеризуется этой координатой в том смысле, что отображение $\ell_4 \mapsto t$ устанавливает биекцию между множеством всех проходящих через точку o прямых ℓ_4 и множеством $\mathbb{k} \sqcup \infty$. Прямых ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 при этом соответствуют значения $t = \infty, 0, 1$. С другой стороны

$$\begin{aligned} [\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] &= \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_3})}{s(\overline{op_2}, \overline{op_3})} : \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_4})}{s(\overline{op_2}, \overline{op_4})} = \\ &= \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_1} + \overline{op_2})}{s(\overline{op_1} + \overline{op_2}, \overline{op_2})} : \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_2} + t\overline{op_1})}{s(\overline{op_2} + t\overline{op_1}, \overline{op_2})} = \\ &= \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_2})}{s(\overline{op_1}, \overline{op_2})} : \frac{s(\overline{op_1}, \overline{op_2})}{t \cdot s(\overline{op_1}, \overline{op_2})} = t. \end{aligned} \quad (2-10)$$

Таким образом, двойное отношение $t = [\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4]$ принимает все значения из поля \mathbb{k} , а также значение ∞ и однозначно характеризует положение четвёртой прямой по отношению к




Рис. 2◊1. $t = [\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4]$.

¹Т. е. пересекающихся в одной точке.

²По-английски *cross-ratio*.

первым трём. Если $[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] = -1$, то прямая ℓ_2 пересекает любую параллельную ℓ_1 прямую ℓ'_1 в середине отрезка, высекаемого из ℓ'_1 прямыми ℓ_3 и ℓ_4 . Такие четвёрки конкурентных прямых называют *гармоническими*.

УПРАЖНЕНИЕ 2.6. Покажите, что гармоничность равносильна тому, что двойное отношение не меняется при перестановке первых двух точек: $[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] = [\ell_2, \ell_1, \ell_3, \ell_4]$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.6

Четыре различные конкурентные прямые $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$ переводятся, соответственно, в четыре различные конкурентные прямые $\ell'_1, \ell'_2, \ell'_3, \ell'_4$ если и только если $[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] = [\ell'_1, \ell'_2, \ell'_3, \ell'_4]$.

Доказательство. Обозначим точки пересечения четвёрок прямых через o и o' . По [упр. 2.4](#) существуют такие тройки точек $p_i \in \ell_i$ и $p'_i \in \ell'_i$, где $i = 1, 2, 3$, что четырёхугольники $op_1p_3p_2$ и $o'p'_1p'_3p'_2$ являются параллелограммами, причём эти тройки единственны с точностью до гомотетий с центрами o и o' . Аффинное преобразование, переводящее параллелограмм $op_1p_3p_2$ в параллелограмм $o'p'_1p'_3p'_2$ является по [предл. 2.5](#) единственным с точностью до гомотетий с центрами o и o' аффинным преобразованием, переводящим прямую ℓ_i в прямую ℓ'_i при $i = 1, 2, 3$. Оно переводит прямую ℓ_4 в прямую ℓ'_4 если и только если точка $p_4 = \ell_4 \cap (p_2p_3)$ делит точки p_2, p_3 в том же отношении, в котором точка $p'_4 = \ell'_4 \cap (p'_2p'_3)$ делит точки p'_2, p'_3 . Согласно (2-10) эти отношения равны двойным отношениям $[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4]$ и $[\ell'_1, \ell'_2, \ell'_3, \ell'_4]$. \square

2.2.2. Двойное отношение четырёх коллинеарных точек. Если в форм. (2-9) на стр. 27 расположить все четыре точки p_i на одной не проходящей через точку o прямой ℓ , как на [рис. 2◊2](#), то двойное отношение площадей треугольников в формуле (2-9) можно переписать как двойное отношение четырёх пропорциональных векторов¹

$$\frac{s(op_1p_3)}{s(op_2p_3)} : \frac{s(op_1p_4)}{s(op_2p_4)} = \frac{\overrightarrow{p_1p_3}}{p_2p_3} : \frac{\overrightarrow{p_1p_4}}{p_2p_4}.$$

Правая часть этого равенства обозначается

$$[p_1, p_2, p_3, p_4] \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\overrightarrow{p_1p_3}}{p_2p_3} : \frac{\overrightarrow{p_1p_4}}{p_2p_4}$$




Рис. 2◊2.

и называется *двойным отношением* упорядоченной четвёрки коллинеарных точек p_1, p_2, p_3, p_4 . Такая четвёрка называется *гармонической*, если $[p_1, p_2, p_3, p_4] = -1$.

2.3. Сравнение аффинной и линейной групп. Аффинная группа $\text{Aff}(V)$ содержит подгруппу *параллельных переносов* или *сдвигов* $T \subset \text{Aff}(V)$, изоморфную аддитивной группе векторов пространства V . Вектору $v \in V$ отвечает при этом изоморфизме сдвиг

$$\tau_v : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V), \quad p \mapsto p + v,$$

а композиции сдвигов отвечает сложение векторов: $\tau_u \circ \tau_w = \tau_{u+w}$. Поскольку для любого аффинного преобразования $\varphi : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V)$ и произвольной точки $p \in \mathbb{A}(V)$ выполняются равенства $\varphi(\tau_v(p)) = \varphi(p+v) = \varphi(p) + D_\varphi(v) = \tau_{D_\varphi(v)}(\varphi(p))$ сдвиги τ_v коммутируют с произвольными аффинными преобразованиями по правилу

$$\varphi \circ \tau_v = \tau_{D_\varphi(v)} \circ \varphi \quad \text{или} \quad \varphi \circ \tau_v \circ \varphi^{-1} = \tau_{D_\varphi(v)}. \quad (2-11)$$

¹См. [упр. 1.10](#) на стр. 20.

Множество всех аффинных преобразований, оставляющих на месте произвольно выбранную точку $p \in \mathbb{A}^2$, образует в $\text{Aff}(V)$ подгруппу, которая называется *стабилизатором* точки p и обозначается

$$\text{Stab}_p \stackrel{\text{def}}{=} \{ \varphi \in \text{Aff}(V) \mid \varphi(p) = p \}.$$

Аффинное преобразование $\varphi \in \text{Stab}_p$ действует на произвольную точку $q \in \mathbb{A}(V)$ по правилу $\varphi(q) = p + D_\varphi(\overline{pq})$. В частности, два аффинных преобразования $\varphi, \psi \in \text{Stab}_p$ совпадают если и только если $D_\varphi = D_\psi$. Таким образом, мы имеем инъективное отображение

$$D : \text{Stab}_p \rightarrow \text{GL}(V), \quad \varphi \mapsto D_\varphi, \quad (2-12)$$

переводящее аффинное преобразование в его дифференциал. Это отображение является изоморфизмом групп, поскольку каждый линейный автоморфизм $F : V \simeq V$ является дифференциалом аффинного преобразования

$$F_p : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V), \quad x \mapsto p + F(\overline{px}), \quad (2-13)$$

оставляющего точку p на месте.

Предложение 2.7

Зафиксируем произвольным образом точку $p \in \mathbb{A}(V)$. Тогда для каждого аффинного преобразования $\varphi \in \text{Aff}(V)$ существуют единственные такие вектор $v \in V$ и линейный автоморфизм $F \in \text{GL}(V)$, что $\varphi = \tau_v \circ F_p$. При этом для всех $u, w \in V$ и всех $F, G \in \text{GL}(V)$

$$(\tau_u \circ F_p) \circ (\tau_w \circ G_p) = \tau_{u+F(w)} \circ (F \circ G)_p. \quad (2-14)$$

Доказательство. Пусть $\varphi(p) = q$. Тогда $\varphi = \tau_v \circ \psi$, где $v = \overline{pq}$ и $\psi = \tau_{-v} \circ \varphi \in \text{Stab}_p$. Тем самым, $\psi = F_p$ для некоторого линейного преобразования $F \in \text{GL}(V)$. Если аффинное преобразование φ допускает два разложения $\tau_v \circ F_p = \varphi = \tau_u \circ G_p$, то применяя к правой и левой частям этого равенства обратный к τ_v сдвиг τ_{-v} , заключаем, что $F_p = \tau_{u-v} \circ G_p$. Так как и F_p , и G_p оставляют точку p на месте, сдвиг τ_{u-v} переводит точку p в себя, откуда $u = v$ и $\tau_{u-v} = \text{Id}$. Поэтому $F_p = G_p$ и $F = G$. Соотношение (2-14) вытекает из формулы (2-11):

$$\tau_u \circ F_p \circ \tau_w \circ G_p = \tau_u \circ F_p \circ \tau_w \circ F_p^{-1} \circ F_p \circ G_p = \tau_u \circ \tau_{F_p(w)} \circ F_p \circ G_p.$$

□

Замечание 2.1. Из предл. 2.7 вытекает, что фиксация точки p аффинном пространстве $\mathbb{A}(V)$ позволяет отождествить множество $\text{Aff}(V)$ с прямым произведением множеств $V \times \text{GL}(V)$ так, что имеющаяся в группе $\text{Aff}(V)$ композиция будет задаваться в терминах $V \times \text{GL}(V)$ правилом

$$(u, F) \circ (w, G) = (u + F(w), FG).$$

В этой ситуации говорят, что группа $\text{Aff}(V)$ является *полупрямым произведением* групп V и $\text{GL}(V)$, и пишут $\text{Aff}(V) = V \rtimes \text{GL}(V)$. Обратите внимание, что отождествление множества $\text{Aff}(V)$ с множеством $V \times \text{GL}(V)$ требует выбора точки $p \in \mathbb{A}(V)$, и два разложения $\tau_u \circ F_p = \varphi = \tau_w \circ F_q$ одного и того же аффинного преобразования $\varphi \in \text{Aff}(V)$, возникающие при фиксации разных точек $p, q \in \mathbb{A}(V)$, имеют один и тот же линейный автоморфизм $F = D_{F_p} = D_{F_q} = D_\varphi \in \text{GL}(V)$, но, вообще говоря, разные сдвиги $\tau_u \neq \tau_w$.

Упражнение 2.7. Убедитесь, что $w = u - \overline{pq} + D_\varphi(\overline{pq})$ и что этот вектор отличен от u если $D_\varphi(\overline{pq}) \neq \overline{pq}$.

2.4. Преобразования, переводящие прямые в прямые. Биективное отображение аффинной плоскости \mathbb{k}^2 в себя называется *полуаффинным*, если оно переводит прямые в прямые. Полуаффинные преобразования, очевидно, образуют группу. В этом разделе мы покажем, что над полями \mathbb{Q} , \mathbb{R} и $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/(p)$, где $p \in \mathbb{N}$ — простое, все полуаффинные преобразования в действительности аффинны, а над произвольным полем \mathbb{k} каждое полуаффинное преобразование $\varphi : \mathbb{k}^2 \rightarrow \mathbb{k}^2$ раскладывается в композицию $\varphi = \varphi_{\text{Aff}} \circ \psi_{\mathbb{k}}$ некоторого аффинного преобразования $\varphi_{\text{Aff}} : \mathbb{k}^2 \rightarrow \mathbb{k}^2$ и преобразования $\psi_{\mathbb{k}} : \mathbb{k}^2 \rightarrow \mathbb{k}^2$, $(x_1, x_2) \mapsto (\psi_{\mathbb{k}}(x_1), \psi_{\mathbb{k}}(x_2))$, задаваемого некоторым автоморфизмом $\psi_{\mathbb{k}} : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$ основного поля \mathbb{k} . Над полями \mathbb{Q} , \mathbb{R} и \mathbb{F}_p подобных «скручиваний с автоморфизмами» нет по той простой причине, что у этих полей нет никаких автоморфизмов кроме тождественного. Мы начнём с напоминаний об автоморфизмах полей.

2.4.1. Отступление об автоморфизмах полей. Отображение поля в себя $\psi : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$ называется *гомоморфизмом*, если $\psi(\lambda + \mu) = \psi(\lambda) + \psi(\mu)$ и $\psi(\lambda\mu) = \psi(\lambda)\psi(\mu)$ для всех $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$.

Упражнение 2.8. Убедитесь, что каждый гомоморфизм $\psi : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$ либо инъективный, либо тождественно нулевой¹, и обладает свойствами $\psi(0) = 0$ и $\psi(\lambda - \mu) = \psi(\lambda) - \psi(\mu)$, а всякий ненулевой гомоморфизм — свойствами $\psi(1) = 1$ и $\psi(\lambda/\mu) = \psi(\lambda)/\psi(\mu)$ при $\mu \neq 0$.

Биективные гомоморфизмы $\mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$ называются *автоморфизмами*. Из [упр. 2.8](#) вытекает, что каждый автоморфизм ψ тождественно действует на всех элементах вида

$$\pm(1 + 1 + \dots + 1)/(1 + 1 + \dots + 1) \in \mathbb{k}$$

с отличным от нуля знаменателем. Поскольку в поле \mathbb{Q} и во всех полях вычетов \mathbb{F}_p никаких других элементов нет, у этих полей нет и никаких автоморфизмов кроме тождественного. Всякий автоморфизм $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ тождественно действует на подполе $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ и является *строго монотонной функцией*, поскольку неравенство $\lambda < \mu$ равносильно тому, что $\mu - \lambda = \alpha^2$ для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$, откуда $\psi(\mu) - \psi(\lambda) = \psi(\mu - \lambda) = \psi(\alpha^2) = \psi(\alpha)^2 > 0$, т. е. $\psi(\lambda) < \psi(\mu)$.

Упражнение 2.9 (по анализу). Пусть строго монотонная функция $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $f(x) = x$ при $x \in \mathbb{Q}$. Покажите, что $f(x) = x$ при всех $x \in \mathbb{R}$.

Таким образом, у поля \mathbb{R} тоже нет никаких автоморфизмов кроме тождественного. А вот поле комплексных чисел \mathbb{C} имеет нетождественный *автоморфизм сопряжения* $z = x + iy \mapsto \bar{z} = x - iy$. Аналогичные автоморфизмы есть и у других полей алгебраических чисел.

Упражнение 2.10. Покажите что множество чисел $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$ является полем и укажите нетождественный автоморфизм этого поля.



2.4.2. Дифференциал полуаффинного преобразования. В силу своей биективности, каждое полуаффинное преобразование $\varphi : \mathbb{k}^2 \rightarrow \mathbb{k}^2$ переводит параллельные прямые в параллельные, а значит, параллелограммы — в параллелограммы. Поэтому из равенства $\overline{pq} = \overline{rs}$ вытекает равенство $\overline{\varphi(p)\varphi(q)} = \overline{\varphi(r)\varphi(s)}$. Это равенство верно, даже когда точки p, q, r, s коллинеарны и не образуют параллелограмма: в этом случае надо выбрать вектор $\overline{x\bar{y}} = \overline{pq} = \overline{rs}$ на параллельной (pq) прямой $(xy) \neq (pq)$, как на [рис. 2.3](#) на стр. 31, и использовать параллелограммы $pxyq$ и $rxys$. Тем самым, каждое полуаффинное отображение $\varphi : \mathbb{A}(V) \rightarrow \mathbb{A}(V)$ корректно задаёт отображение векторов

$$D_\varphi : V \rightarrow V, \quad \overline{pq} \mapsto \overline{\varphi(p)\varphi(q)}. \quad (2-15)$$

¹Т. е. $\psi(\lambda) = 0$ для всех $\lambda \in \mathbb{k}$.

Поскольку φ переводит параллелограмм со сторонами u , v в параллелограмм со сторонами $D_\varphi(u)$ и $D_\varphi(w)$, отображение (2-15) аддитивно: $D_\varphi(u + w) = D_\varphi(u) + D_\varphi(w)$, причём это равенство справедливо даже когда векторы u и w пропорциональны, поскольку вектор u всегда можно представить в виде суммы векторов v_1 и v_2 , каждый из которых не пропорционален u , как на рис. 2◊4, и тогда

$$\begin{aligned} D_\varphi(u + w) &= D_\varphi(v_1 + v_2 + w) = D_\varphi(v_1) + D_\varphi(v_2 + w) = \\ &= D_\varphi(v_1) + D_\varphi(v_2) + D_\varphi(w) = D_\varphi(v_1 + v_2) + D_\varphi(w) = D_\varphi(u) + D_\varphi(w). \end{aligned}$$

Рис. 2◊3. Корректность определения D_φ .Рис. 2◊4. Аддитивность D_φ .

Полуаффинное преобразование φ однозначно восстанавливается, как только известен его дифференциал (2-15) и образ $\varphi(p)$ хотя одной точки p . Каждая точка q будет переводиться таким преобразованием в точку $\varphi(q) = \varphi(p) + \overline{\varphi(p)\varphi(q)} = \varphi(p) + D_\varphi(\overline{pq})$.

Предложение 2.8

Дифференциал D_φ полуаффинного преобразования φ полулинеен, т. е.

$$D_\varphi(\lambda u + \mu w) = \psi(\lambda) \cdot D_\varphi(u) + \psi(\mu) \cdot D_\varphi(w) \quad (2-16)$$

для всех $u, w \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$ и некоторого зависящего лишь от φ автоморфизма $\psi : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$.

Доказательство. Поскольку φ переводит прямые в прямые, D_φ переводит векторы, пропорциональные данному вектору v , в векторы, пропорциональные $D_\varphi(v)$. Поэтому каждый ненулевой вектор $v \in V$ задаёт отображение $\psi_v : \mathbb{k} \rightarrow \mathbb{k}$, определяемое равенством

$$D_\varphi(\lambda v) = \psi_v(\lambda) \cdot D_\varphi(v).$$

В силу биективности φ , все отображения ψ_v биективны. Покажем, что $\psi_u = \psi_w$ для любых двух непропорциональных векторов u, w . Так как пересекающиеся в одной точке прямые переходят в прямые, которые тоже пересекаются в одной точке, векторы $D_\varphi(u)$ и $D_\varphi(w)$ не пропорциональны и образуют базис. Из аддитивности D_φ вытекает, что

$$\begin{aligned} D_\varphi(\lambda(u + w)) &= \psi_{u+w}(\lambda) \cdot D_\varphi(u + w) = \psi_{u+w}(\lambda) \cdot D_\varphi(u) + \psi_{u+w}(\lambda) \cdot D_\varphi(w) \\ &\parallel \\ D_\varphi(\lambda u + \lambda w) &= D_\varphi(\lambda u) + D_\varphi(\lambda w) = \psi_u(\lambda) \cdot D_\varphi(u) + \psi_w(\lambda) \cdot D_\varphi(w). \end{aligned}$$

Из единственности разложения вектора по базису мы заключаем, что для всех $\lambda \in \mathbb{k}$ выполняются равенства $\psi_u(\lambda) = \psi_{u+w}(\lambda) = \psi_w(\lambda)$. На самом деле они выполняются и тогда, когда векторы u и w пропорциональны, поскольку для любого непропорционального им вектора v

мы имеем $\psi_u = \psi_v = \psi_w$. Таким образом, отображение ψ_v на самом деле не зависит от v и может быть обозначено просто ψ . Из аддитивности D_φ вытекает, что ψ перестановочно со сложением и умножением: равенства

$$\begin{aligned}\psi(\lambda + \mu) \cdot D_\varphi(v) &= D_\varphi((\lambda + \mu)v) = D_\varphi(\lambda v + \mu v) = D_\varphi(\lambda v) + D_\varphi(\mu v) = \\ &= \psi(\lambda) \cdot D_\varphi(v) + \psi(\mu) \cdot D_\varphi(v) = (\psi(\lambda) + \psi(\mu)) \cdot D_\varphi(v)\end{aligned}$$

показывают, что $\psi(\lambda + \mu) = \psi(\lambda) + \psi(\mu)$, а из равенств

$$\psi(\lambda\mu) \cdot D_\varphi(v) = D_\varphi((\lambda\mu)v) = D_\varphi(\lambda(\mu v)) = \psi(\lambda) \cdot D_\varphi(\mu v) = \psi(\lambda)\psi(\mu) \cdot D_\varphi(v)$$

вытекает, что $\psi(\lambda\mu) = \psi(\lambda) \cdot \psi(\mu)$. Тем самым, ψ является автоморфизм поля \mathbb{k} . □

Следствие 2.3

Над полями \mathbb{Q} , \mathbb{R} и \mathbb{F}_p биективное преобразование аффинной плоскости аффинно если и только если оно переводит прямые в прямые. □

Ответы и указания к некоторым упражнениям

Упр. 2.2. Рассмотрите в координатном пространстве \mathbb{k}^2 с базисом (e_1, e_2) пару векторов $(f_1, f_2) = (e_1, e_2)A$ и пару векторов $(g_1, g_2) = (f_1, f_2)B = (e_1, e_2)AB$. Тогда по сл. 1.2 для любой ненулевой формы площади s на V выполняются равенства

$$s(f_1, f_2) = s(e_1, e_2) \det A, \quad s(g_1, g_2) = s(f_1, f_2) \det B, \quad s(g_1, g_2) = s(e_1, e_2) \det(AB),$$

из которых вытекает, что $\det(A) \det(B) = \det(AB)$.

Упр. 2.3. Все площади умножаются на $\det A$, ср. с предл. 2.4 на стр. 25.

Упр. 2.4. Условие $\overline{op_3} = \overline{op_1} + \overline{op_2}$ означает, что четырёхугольник $op_1p_3p_2$ является параллелограммом, т. е. прямые (p_1p_3) и (p_2p_3) параллельны прямой $\ell_2 = (op_2)$ и $\ell_1 = (op_1)$ соответственно. Но для любой точки $p_1 \in \ell_1$ имеется единственная проходящая через p_1 прямая, параллельная прямой ℓ_2 , и она пересекает прямую ℓ_3 в единственной точке p_3 . Через точку p_3 проходит единственная прямая, параллельная прямой ℓ_1 , и она пересекает прямую ℓ_2 в единственной точке p_2 . Таким образом, параллелограмм $op_1p_3p_2$ однозначно определяется выбором точки $p_1 \in \ell_1$. При выборе другой точки p'_1 с радиус-вектором $\overline{op'_1} = \lambda \overline{op_1}$ определяемый ею параллелограмм $op'_1p'_3p'_2$ получается из параллелограмма $op_1p_3p_2$ гомотетией с коэффициентом λ относительно точки o .

Упр. 2.5. При замене функции s на λs или любого из векторов $\overline{op_i}$ на $\lambda \overline{op_i}$, где $\lambda \neq 0$, коэффициент λ сократится. Неизменность двойного отношения при одновременной перестановке двух пар прямых видна непосредственно из формулы форм. (2-9) на стр. 27.

Упр. 2.6. Прямо из определения двойного отношения вытекает равенство

$$[\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4] = \frac{1}{[\ell_2, \ell_1, \ell_3, \ell_4]},$$

из которого всё и следует.

Упр. 2.7. Это следует из равенства $q + w = \varphi(q) = p + u + D_\varphi(\overline{pq})$.

Упр. 2.8. Вычитая $\psi(0)$ из правой и левой части равенства $\psi(0) = \psi(0+0) = \psi(0) + \psi(0)$, получаем $0 = \psi(0)$. Поскольку $\psi(\mu) + \psi(-\mu) = \psi(\mu - \mu) = \psi(0) = 0$, имеет место равенство $\psi(-\mu) = -\psi(\mu)$. Поэтому $\psi(\lambda - \mu) = \psi(\lambda) + \psi(-\mu) = \psi(\lambda) - \psi(\mu)$. Если $\psi(1) \neq 0$, то аналогичным образом умножая на $\psi(1)^{-1}$ обе части равенства $\psi(1) = \psi(1 \cdot 1) = \psi(1) \cdot \psi(1)$ получаем $\psi(1) = 1$, откуда, как и выше, $\psi(\mu^{-1}) = \psi(\mu)^{-1}$ и $\psi(\lambda/\mu) = \psi(\lambda)/\psi(\mu)$ при всех λ и $\mu \neq 0$. Если же $\psi(1) = 0$, то $\psi(\lambda) = \psi(1 \cdot \lambda) = \psi(1) \cdot \psi(\lambda) = 0$ для всех λ .

Упр. 2.10. Обратным к $x + y\sqrt{2}$ числом является $\frac{x}{x^2-2y^2} - \frac{y}{x^2-2y^2}\sqrt{2}$, нетривиальный автоморфизм переводит $x + y\sqrt{2}$ в $x - y\sqrt{2}$.